



**Euwied<sup>®</sup> Duderstädter  
VSEL-SCs - Extrakt Präparate**

**欧维蒂<sup>®</sup>杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素  
使用说明书**

**Gebrauchsinformation**

**Euwied® Duderstädter VSEL-SCs Extrakt Präparate**  
**欧维蒂® 杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素**  
**创新型的抗衰老技术**

**再生·活化·抗衰老**

欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素含有极小胚胎样干细胞精华，生物活性寡核苷酸和生物肽。这些活性物质对蛋白质代谢以及细胞再生和自我修复非常重要。欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素制剂套件能够激活细胞和体液免疫系统。对老年病及荷尔蒙失调的改善有积极作用，能够运用在术后和加速康复。  
欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素特别适合运用于抗衰老。

**功效:**

1. 全面激活沉睡细胞，为人体逐日增加动力和能量，促进老化衰竭细胞更新分裂。
2. 全身心抗衰老，消除临床蛋白质代谢所产生的老化问题和促进细胞再生。
3. 全方位调节身体的生理功能和代谢功能，全面提升细胞含氧量，迅速提升精力和体能。
4. 提高免疫力，改善血液循环和末梢循环，为疲倦老化细胞补充大量的能量和养分。
5. 全面改善人体的内环境，加速新陈代谢，提高睡眠质量。
6. 调解内分泌，促进生理荷尔蒙合成和分泌，提高性功能，有效延缓衰老，推迟更年期，并让更年期顺利平稳度过。
7. 恢复皮肤的紧致和细腻，平复皱纹，淡化色素。
8. 激活细胞，促进体液循环，改善印细胞老化失去功能而导致的脂肪和多余水份的沉积，重塑完美曲线和年轻体能。
9. 预防老化及治疗因为老化所出现的复杂症状。

**作为抗衰老套件欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素制剂含有如下几种针剂 (安瓿瓶):**

1. 10x 欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素 每支 4ml
2. 10x 欧维蒂®激活动能素 每支 2ml
3. 10x 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O 每支 2ml (针对女性) 或者 10x 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L 每支 2ml (针对男性)

**1. 欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素使用方式:**  
**肌肉注射针剂**

**成分:**

一安瓿4ml针剂含有: 极小胚胎样干细胞相关生长因子,  
寡核苷酸和生物活性肽 40mg

**辅助成分:**

注射生理盐水

**适应症:**

腺功能失调, 低血压, 硬化, 男性和女性老年症状, 复杂更年期症状, 再生和活化。

**禁忌症:**

嘌呤代谢失调, 高度过敏。

**副作用:**

迄今无已知的副作用。

**灌装方式及大小:**

10安瓿每支4ml

**2. 欧维蒂®激活动能素**

含普鲁卡因和维他命B族的抗老化针剂

**成分:**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 盐酸普鲁卡因 Procainhydrochlorid      | 50 mg |
| 维他命 B1 Vitamin B1               | 10 mg |
| 维他命 B2 Vitamin B2               | 3 mg  |
| 维他命 B6 Vitamin B6               | 5 mg  |
| 生理盐水 Natriumchlorid und Aqua ad | 2 mg  |

**适应症:**

老年综合症状, 增加活化, 脑和外周循环障碍, 动脉硬化, 护肝治疗。

**禁忌症:**

急性充血性心脏衰竭, 严重心动过缓, 心律失常。

**副作用及其风险:**

对易感患者会引起过敏反应。

减少剂量能够避免过敏反应。

**产品规格:**

10安瓿每支2ml

**3.1 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O****成分:**

2ml注射针剂含有如下药用作用成分:

|  |        |
|--|--------|
| 总状升麻 Cimicifuga racemosa D3 dil.         | 0,5 ml |
| 粉条儿菜 Aletris farinosa D3 dil.            | 0,5 ml |
| 白头翁禾 Pulsatilla pratensis D4 dil.        | 0,5 ml |
| 红毛七属蕨 Caulophyllum thalictroides D3 dil. | 0,5 ml |

**其余的成分:**

生理盐水

**适应症:**

荷尔蒙功能紊乱, 更年期症状, 月经来潮, 月经失调, 女性外阴部位的功能障碍。

**禁忌症:**

与其它药物的相互作用迄今未知。

**注意事项:**

对于自然疗法而言, 不良的生活方式以及烟酒嗜好影响而减低其疗效。如果您同时服用其他药物, 需要向医生咨询。

**剂量及给药方法:**

下面的说明适用, 如果医生没有对欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂剂量另行说明, 遵照如下关于欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂的治疗计划列举的用量执行。

**副作用:**

使用欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂迄今未观察到副作用。

在使用自然疗法药物中可能开始会暂时加重原有的不适。此种情况应该停药, 然后咨询医生或者代理机构。如果您在使用过程中观察到其他的不在本使用说明陈述的副作用, 请转告医生或者代理机构。

**3.2 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L****成分:**

2ml注射针剂含有如下药用作用成分:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 寻常型小檗 Berberis vulgaris D4 dil.  | 0,5 ml |
| 白屈菜 Chelidonium majus D3 dil.    | 0,5 ml |
| 水飞蓟 Silybum marianum D3 dil.     | 0,5 ml |
| 烛台虎尾草 Veronica virginica D3 dil. | 0,5 ml |

**其余的成分:**

生理盐水

**适应症:**

肝病, 肝炎, 糖尿病, 高脂血症, 胆囊疾病, 例如胆管炎, 胆囊炎。腹泻, 消化不良。

**禁忌症:**

与其它药物的相互作用迄今未知。

**注意事项:**

对于自然疗法而言, 不良的生活方式以及烟酒嗜好影响而减低其疗效。

如果您同时服用其他药物, 需要向医生咨询。

**剂量及给药方法:**

下面的说明适用, 如果医生没有对欧维蒂®自然疗法护肝针剂剂量另行说明, 请遵照如下关于欧维蒂®自然疗法护肝针剂的治疗计划列举的用量执行。

### 副作用:

使用欧维蒂®自然疗法护肝针剂迄今未观察到副作用。

在使用自然疗法药物中可能开始会暂时加重原有的不适。此种情况应该停药，然后咨询医生或者代理机构。如果您在使用过程中观察到其他的不在本使用说明陈述的副作用，请转告医生或者代理机构。

### 治疗计划:

欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素抗衰老

作为抗衰老套件欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素制剂含有如下几种针剂 (安瓿瓶):

1. 10x 欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素 每支 4ml
2. 10x 欧维蒂®激活动能素 每支 2ml
3. 10x 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O 每支 2ml (针对女性) 或者 10x 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L 每支 2ml (针对男性)

### 治疗计划 1: 欧维蒂®杜德斯塔特极小胚胎样干细胞精华素

| 治疗日期  | 用量          | 使用方法 |
|-------|-------------|------|
| 第一天   | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第四天   | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第七天   | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十天   | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十三天  | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十六天  | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十九天  | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十二天 | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十五天 | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十八天 | 1 x 4 ml 安瓿 | 肌肉注射 |

### 治疗计划 2: 欧维蒂®激活动能素


| 治疗日期  | 用量          | 使用方法 |
|-------|-------------|------|
| 第一天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第四天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第七天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十三天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十六天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第十九天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十二天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十五天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |
| 第二十八天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 肌肉注射 |

### 治疗计划 3: 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 或者 欧维蒂®自然疗法护肝针剂

| 治疗日期  | 用量          | 使用方法     |
|-------|-------------|----------|
| 第一天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第四天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第七天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十天   | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十三天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十六天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第十九天  | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第二十二天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第二十五天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |
| 第二十八天 | 1 x 2 ml 安瓿 | 皮下或者肌肉注射 |

## 主要感应部位注射以及肌肉注射 (片段治疗)

- 区域 1:** 和这里的产品无关
- 区域 2:** 和这里的产品无关
- 区域 3:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 4:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 5:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)
- 区域 6:** 欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)
- 区域 7:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)  
欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华
- 区域 8:** 欧维蒂®自然疗法护肝针剂 (肝/胆)  
欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂 (卵巢)
- 区域 9:** 欧维蒂®激活动能素  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华
- 区域 10:** 欧维蒂®激活动能素  
欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华



## 最佳注射:

- 使用一次使用的20毫米针筒。
- 每个注射点进行0.2-0.3ml的皮下注射，一支 安瓿针剂分别在4-6个点进行注射。
- 之前注射过的位置已经进行过刺激了，所以应该选择其他未注射过的注射点。
- 穴位点需要对称注射。
- 没有注射完的剩余针剂可以进行肌肉注射。
- 该针剂能够和自己的血液一起混合。
- 为了提高针剂的效果，欧维蒂®自然疗法护肝/卵巢针剂可以进行如下的穴位注射。

## 专业穴位注射 (仅适用于专业理疗师)

### 欧维蒂®自然疗法护肝针剂/Euwied® Homöokomplex L:

该针剂也能够主要在主要感应部位注射:区域3, 4和5

- **肝病, 肝炎:** B 18 肝脏关联点 (ZP), B 23 肾关联点 (ZP), Le 13
- **糖尿病, 高脂血症:** B 20 脾脏-胰腺关联点 (ZP)
- **胆囊疾患, 例如: 胆管炎, 胆囊炎:** B 18, B 19胆关联点 (ZP), B 23, Le 13
- **腹泻:** B 25 大肠关联点 (ZP), B 42, B 43, KG 12
- **消化不良:** B 22 三焦关联点 (ZP), B 25 大

### KG 12:

在下部胸骨和肚脐之间的中间。

### Le 13:

在腋中线, 第11肋骨自由端正下方。

### B 42:

第9胸椎下缘, 垂直于内肩胛骨的边缘。

### B 43:

第10胸椎下缘, 垂直于内肩胛骨的边缘。

### B 18:

横向于背中线2横指在第9和第10胸椎高度之间。

### B 19:

横向于背中线2横指在第10和第11胸椎高度之间。

### B 20:

横向于背中线2横指在第11和第12胸椎高度之间。

### B 22:


第1腰椎和第2腰椎之间的高度, 横向于背中线2横指。

### B 23:

第2腰椎和第3腰椎之间大高度, 横向于背中线2横指。

### B 25:

第4腰椎和第5腰椎之间的高度, 横向于背中线2横指。



专业穴位注射  
(仅适用于专业理疗师)

欧维蒂®自然疗法护卵巢针剂/Euwied® Homöokomplex O  
和欧维蒂®杜德斯塔特植物干细胞精华 (女性):  
该针剂也能够主要感应部位注射:区域6, 7和8

- 激素功能障碍: G 26
- 更年期不适: B 31 更年期主点(M-P), MP 6
- 月经来潮, 月经失调: N 13, B 30, Le 5
- 女性的外阴部位的功能障碍: KG 7

**G 26:**  
在肚脐的水平腋前线。

**G 30:**  
病人横向躺着时 (略屈腿),  
股骨大转子的隆起背后。

**KG 7:**  
在肚脐和耻骨连线上,  
肚脐以下1/5。


**N 13:**  
肚脐以下4横指,  
偏离中线1横指。

**Le 5:**  
在腓骨胫节, 内踝以上8横指。

**MP 6:**  
胫骨内踝头颅方向4横指。

**B 30:**  
第4骶后孔高度,  
横向于背中线2横指

**B31:**  
第一骶后孔背正上方。



在怀孕的情况下如下穴位点以及自然疗法针剂是不能够使用的:  
KG 7, KG 9, KG 12, Le 5, G 26, N 13, B 31, MP 6, M 36



欧维蒂<sup>®</sup>

德国纽伦堡

**欧亚医疗健康管理有限公司**  
**EURASIA MEDICAL**  
**GESUNDHEITSMANAGEMENT GMBH**

Hainstraße 25  
90461 D-Nürnberg

Tel. +49 (0) 911/48 04 13 90

[www.eurasia-medical.de](http://www.eurasia-medical.de)